

CALENDÁRIO VACINAL SBIIm 2024/2025

Do nascimento à terceira idade



VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE																			ADOLESCENTE		ADULTO		IDOSO	DISPONIBILIDADE DAS VACINAS				
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 a 19 anos	20 a 49 anos	50 a 59 anos	A partir de 60 anos	GRATUITAS NA REDE PÚBLICA	CLÍNICAS PRIVADAS	NOS CRIE*				
BCG ID	1 Dose	Vacinar os não vacinados anteriormente													Vacinar pessoas contactantes de hanseníase					SIM	SIM	NÃO							
Hepatite B	Três ou quatro doses a partir do nascimento										Vacinar os não vacinados anteriormente									SIM	SIM	SIM							
Rotavírus	Vacina rotavírus monovalente: duas doses aos 2 e 4 meses de idade. Vacina rotavírus pentavalente: três doses aos 2, 4 e 6 meses de idade.			Vacinar os não vacinados anteriormente D1 até 11 meses e 29 dias e última dose até 23 meses e 29 dias						CONTRAINDICADA											SIM	SIM	NÃO						
Tríplice bacteriana (DTPw, DTPa ou dTpa)	Três doses (DTPa ou DTPw) iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	Reforço com DTPa, DTPw ou dTpa		Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou, na impossibilidade de dTpa, usar dT)					SIM, DTPw e dT; dTpa para gestantes e profissionais da saúde	SIM, DTPa e dTpa	SIM, DTPa							
Haemophilus influenzae b	Três doses iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	Vacinar pessoas em situações especiais de risco										SIM, três primeiras doses	SIM	SIM				
Poliomielite (vírus inativados)	Três doses iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	REFORÇO	Vacinar pessoas em situações especiais de risco					SIM, três primeiras doses e reforço aos 15 meses	SIM	SIM								
Pneumocócicas conjugadas	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada VPC20, VPC15, VPC13 ou VPC10 (PNI), iniciando aos 2 meses de idade											REFORÇO	VPC20, VPC15, VPC13 ou VPC10 (PNI) – Vacinar os não vacinados anteriormente		VPC20, VPC15, VPC13: vacinar pessoas em situações especiais de risco					VPC20, VPC15, VPC13: uma dose	SIM, VPC10, menores de 5 anos	SIM	SIM, VPC10 e VPC13						
Pneumocócica 23 valente												Vacinar pessoas em situações especiais de risco					Duas doses com intervalo de cinco anos		NÃO	SIM	SIM								
Meningocócica conjugada ACWY ou C	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade											REFORÇO	REFORÇO	Para não vacinados até 15 anos, duas doses com intervalo de cinco anos. A partir de 16 anos, uma dose		Vacinar pessoas em situações especiais de risco					SIM, menC para menores de 5 anos e menACWY para 11 a 14 anos	SIM	SIM, menC e menACWY						
Meningocócica B	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade											REFORÇO	Para os não vacinados anteriormente – Duas ou três doses de acordo com a faixa etária e a vacina utilizada					Vacinar pessoas em situações especiais de risco					NÃO	SIM	NÃO				
Influenza (gripe)												VACINAÇÃO ANUAL										SIM, Trivalente menores de 5 anos e maiores de 60 anos	SIM, Tri ou Tetravalente e HD4V (60 anos ou +)	SIM, Trivalente					
Febre amarela												Duas doses: aos 9 meses de vida e aos 4 anos de idade. / Recomendação do PNI: se recebeu a primeira dose antes dos 5 anos, indicada uma segunda dose, independentemente da idade atual. Se aplicada a partir dos 5 anos: dose única. / Recomendação da SBIIm: Duas doses. Como há possibilidade de falha vacinal mesmo para quem receber a primeira dose a partir dos 5 anos, a SBIIm recomenda uma segunda dose dez anos após. / Essa vacina pode ser exigida para emissão do CIVP, atendendo exigências sanitárias de alguns destinos internacionais. Neste caso, deve ser aplicada até dez dias antes de viajar.										SIM	SIM	NÃO					
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)												Duas doses a partir dos 12 meses		Vacinar os não vacinados anteriormente					Vacinar pessoas em situações especiais de risco					SIM, até 59 anos	SIM	NÃO			
Varicela (catapora)												Duas doses a partir dos 12 meses		Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente					Vacinar pessoas em situações especiais de risco					SIM	SIM	SIM			
Hepatite A												Duas doses a partir dos 12 meses		Vacinar os não vacinados anteriormente					Vacinar pessoas em situações especiais de risco					SIM, uma dose para menores de 5 anos	SIM	SIM			
HPV**												Duas doses com intervalo mínimo de seis meses entre elas.					Vacinar adultos com três doses (0-1 a 2-6 meses)		A critério médico, vacinar pessoas em situações especiais de risco, três doses (0-1 a 2-6 meses)					SIM, HPV4 uma dose para meninas e meninos de 9 a 14 anos.	SIM, HPV9	SIM, HPV4 três doses para homens e mulheres até 45 anos pertencentes a grupos especiais			
Herpes zóster												Duas doses, dois meses de intervalo. A partir dos 18 anos, vacinar pessoas em situações especiais de risco					Duas doses, dois meses de intervalo. Rotina a partir dos 50 anos					NÃO	SIM	NÃO					
Dengue***												Qdenga® é a vacina preferencial, recomendada entre 4 e 60 anos, independente de contato prévio com o vírus da dengue – duas doses com intervalo de três meses entre elas. Dengvaxia® é recomendada entre 6 e 45 anos, somente para soropositivos para dengue – três doses com intervalo de seis meses entre elas.										SIM, Qdenga® para 10 a 14 anos					SIM	SIM	NÃO
Covid-19	Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/covid-19																												
VSR	Nirsevimabe – Dose única para ≤ 1 ano na primeira sazonalidade											Imunizar crianças em situações especiais de risco					Vacina VSR**** – Uma dose					NÃO	SIM	NÃO					

14/12/2024 – Orientações, esquemas de doses e comentários devem ser consultados nos *Calendários de vacinação SBIIm 2024/2025* e nos *Calendários de vacinação SBIIm pacientes especiais*.

*** Notas técnicas do MS: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/dengue/notas-tecnicas>

**** Arexvy® (GSK) e Abrysvo® (Pfizer) uma dose, aplicar a qualquer momento, independente da sazonalidade. Em idosos de 60-69 anos, em condições de risco e de rotina para ≥ 70 anos.

* Consultar manual do CRIE em <https://sbim.org.br/images/calendarios/manual-dos-centros-de-referencia-para-imunobiologicos-especiais-6a-edicao-2023.pdf> (acesso em 27.03.2024). Para pacientes com determinadas doenças crônicas e sob orientação médica, consultar os *Calendários de vacinação SBIIm pacientes especiais*.

** Esquemas para menores de 20 anos. PNI: HPV4 uma dose dos 9-14 anos. SBIIm: HPV9 duas doses dos 9-19 anos e três doses de 20 anos em diante.

● Rotina ● Vacinar não vacinados ● Situações especiais ● Contraindicada



Manual do CRIE



Calendários de vacinação SBIIm